

1 mL 1 Dose

Encephalomyelitis-Influenza Vaccine

Eastern & Western, Killed Virus

Tetanus Toxoid

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy horses 10 months of age or older against encephalomyelitis caused by Eastern and Western viruses, equine influenza due to type A2 viruses, and tetanus. Duration of immunity has not been established. For more information regarding efficacy and safety data, go to productdata.aphis.usda.gov.

Fluvac Innovator 4 contains equine influenza virus A/equine-2/Kentucky/97 (H3N8)-American Lineage. Store at 2°-8°C. Do not freeze. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Contains formalin, thimerosal, neomycin, and polymyxin B as preservatives. See reverse side for complete directions.

Field safety testing has demonstrated that this product is safe for use in horses 3 months of age or older. Efficacy has not been established in foals 3 months of age.

Efficacy has been demonstrated in 10-month-old horses by challenge with equine influenza virus A/equine-2/Ohio/03 (H3N8)-American Lineage.

Directions: Shake well. Aseptically administer 1 mL intramuscularly. Healthy horses should receive two doses administered 3-4 weeks apart. For advice on revaccination frequency or in the face of stress or exposure, contact your veterinarian or the manufacturer.

Precautions: Store at 2°-8°C. Prolonged exposure to higher temperatures and/or direct sunlight may adversely affect potency. Do not freeze. Use entire contents when first opened. Transient local reactions may occur at the injection site. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. This product has not been tested in pregnant animals. Contains formalin, thimerosal, neomycin, and polymyxin B as preservatives. In case of allergic reaction, administer epinephrine. Do not mix with other products. In case of human exposure, contact a physician.

Technical inquiries should be directed to Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

Remove serial number and expiration date label and place on the animal's medical chart.

1 Dosis 1 mL

Vacuna contra la Encefalomielitis e Influenza

Virus del Este y Oeste inactivado

Toxoiide Tetánico

Este producto ha mostrado ser efectivo para vacunar caballos sanos de 10 meses de edad o mayores contra la encefalomielitis causada por el virus Este y Oeste la influenza equina causada por los virus tipo A2, y el tétanos. No se ha determinado la duración de la inmunidad. Obtenga más información sobre la eficacia y datos de seguridad en productdata.aphis.usda.gov. Fluvac Innovator 4 contiene virus de influenza equina A/equina-2/Kentucky97 (H3N8)-Linaje Americano. Almacenar entre 2° y 8°C. Evitar la congelación. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Contiene formalina, timerosal, neomicina y polimixina B como agentes conservantes. Ver las instrucciones completas al reverso.

Estudios de seguridad en campo han demostrado que este producto es seguro para ser usado en caballos de 3 meses de edad o mayores. La eficacia no has sido establecida en potros de 3 meses de edad.

Se ha demostrado la eficacia en caballos de 10 meses de edad o mayores por medio del desafío con el virus de influenza equina A/equina-2/Ohio/03 (H3N8)-Linaje Americano.

Instrucciones: Agitar bien. Asepticamente administrar 1 mL por vía intramuscular. Los caballos sanos deben recibir dos dosis administradas con 3-4 semanas de diferencia. Para obtener consejos sobre la frecuencia de revacunación o ante el estrés o la exposición, consulte a su veterinario o al fabricante.

Precauciones: Almacenar entre 2° y 8°C. La exposición prolongada a temperaturas más elevadas y/o a la luz directa del sol puede afectar adversamente la potencia. Evitar la congelación. Utilizar todo el contenido una vez abierto. En algunas ocasiones, pueden presentarse reacciones locales transitorias en el sitio de inyección. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Este producto no ha sido probado en animales gestantes. Contiene formalina, timerosal, neomicina y polimixina B como agentes conservantes. En caso de reacción anafiláctica, administrar epinefrina. No mezclar con otros productos. Consulte al Médico en caso de exposición al producto.

Las preguntas técnicas se deben dirigir a Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

Desprender la etiqueta con el número de lote y la fecha de vencimiento y colocarlo en el registro médico del animal.

VLN 190/PCN 4835.26
Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA

