

1 mL

Tetanus Toxoid

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy horses, sheep, and swine against tetanus. Duration of immunity has not been established. For more information regarding efficacy and safety data, go to productdata.aphis.usda.gov.

This product is safe for use in pregnant mares as a single dose during the third trimester of pregnancy.

Store at 2°-8°C. Do not freeze. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Contains formalin, thimerosal, neomycin and polymyxin B as preservatives.

DIRECTIONS: Shake well. Healthy horses should receive two 1-mL doses administered intramuscularly 4-8 weeks apart. Sheep, swine, and smaller horses (such as Shetland ponies or miniature breeds) should receive two 0.5-mL doses administered 4-8 weeks apart. Protective tetanus antibody titers usually occur two weeks after the second injection of the initial series. In the event of injury during the course of the initial vaccination program, a prophylactic dose of at least 1500 units of tetanus antitoxin should be given.

For advice on revaccination, contact a veterinarian or the manufacturer.

PRECAUTIONS: Store at 2°-8°C. Prolonged exposure to higher temperatures and/or direct sunlight may adversely affect potency. Do not freeze. Use entire contents when first opened. Transient local reactions may occur at the injection site. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Contains formalin, thimerosal, neomycin and polymyxin B as preservatives. Do not mix with other products. In case of human exposure, contact a physician.

Technical inquiries should be directed to Zoetis Inc. Veterinary Services (888) 963-8471.

Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA

1 mL

Toxoide Tetánico

Este producto ha demostrado ser efectivo para vacunar caballos sanos, ovejas y cerdos contra el tétano. La duración de la inmunidad no se ha establecido. Obtenga más información sobre la eficacia y datos de seguridad en productdata.aphis.usda.gov.

Este producto es seguro para usar en yeguas gestantes como una sola dosis durante el tercer trimestre de gestación.

Almacenar entre 2° y 8°C. Evitar la congelación. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Contiene formalina, timerosal, neomicina y polimixina B como agentes conservantes.

INSTRUCCIONES: Agítese bien. Los caballos sanos deben recibir dos dosis de 1-ml administradas intramuscularmente de 4 a 8 semanas aparte. Las ovejas, cerdos y caballos pequeños (como ponies Shetland o crías en miniatura) deben recibir dos dosis de 0.5-mL administradas de 4 a 8 semanas aparte. Normalmente se producen títulos de anticuerpos de protección contra tétanos dos semanas después de la segunda inyección de la serie inicial. En el caso de lesión durante el programa de vacunación inicial o si no se han administrado vacunaciones de refuerzo anuales, se recomienda dar una dosis profiláctica de por lo menos 1500 unidades de antitoxina tetánica.

Para asesoría en la revacunación, consulte a su Médico Veterinario o al fabricante.

PRECAUCIONES: Almacenar entre 2° y 8°C. La exposición prolongada a temperaturas más elevadas y/o a la luz directa del sol puede afectar adversamente la potencia. Evitar la congelación. Usar todo el contenido del frasco una vez abierto. Pueden ocurrir reacciones locales transitorias en el sitio de la inyección. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Contiene formalina, timerosal, neomicina y polimixina B como agentes conservantes. No mezclar con otros productos. Consulte al Médico en caso de exposición al producto.

Las preguntas técnicas se deben dirigir a Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA